

95 年度 5 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 95 年 6 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 一位 64 歲男性因胸痛半小時，打電話給家庭醫師求助，下列敘述之處置何者為是？
- (a) 在電話中詳細詢問胸痛型態及了解病情給于醫療諮詢。
 - (b) 請病患到門診以便了解病情。
 - (c) 請病患立即至居家附近之大型醫院急診求診。
 - (d) 請病患先行服用止痛藥物後再觀察病情變化。
- () 2. 一位 72 歲女性半夜因突發性胸痛，到急診求診，到達急診時神智清醒血壓正常，但仍存在胸部不適。下列敘述之處置何者為是？
- (a) 馬上接受 12 導程心電圖檢查。
 - (b) 6 至 12 小時後抽取心肌酵素檢驗。
 - (c) 立即給予血栓溶解劑治療。
 - (d) 轉介至心臟科門診。
- () 3. 上述患者經檢查後，心電圖心臟酵素皆無異常，下一步的處置何者為非？
- (a) 尋找可以解釋症狀產生的非冠狀動脈原因。
 - (b) 請病患回家休息，回心臟科門診追蹤。
 - (c) 應在症狀發作後 6 至 12 小時重覆心電圖和心臟酵素測量。
 - (d) 病患持續有休息時疼痛時，以連續 ECG 監測缺血和偵測心律不整。

- () 4. 56歲男性使用 Viagra 後 3 小時因持續性胸痛盜汗，到急診求診，下列處置何者為非？
- (a) 供應氧氣
 - (b) 舌下含片再繼以靜脈注射硝化甘油（NTG）以立即舒解缺血與相關症狀
 - (c) 執行 12 導程心電圖檢查
 - (d) 測量心臟傷害的心肌酵素
- () 5. 下列有關抗小板與抗凝血治療的作用，何者為非？
- (a) 在無出血的高度風險時，應於 PCI 之前投與 ASA 和 clopidogrel。
 - (b) 對於有持續缺血或其他高風險特性的病患，若要計畫早期侵入性治療時，應使用血小板糖蛋白 GP IIb/IIIa 受體拮抗劑。
 - (c) 計畫 CABG 的病患服用 clopidogrel 時，如果可能應停藥至少 5 天，最好是 7 天。
 - (d) 低分子量肝素（LMWH）的劑量應滴定至激活部分促凝血酶原激酶時間（APTT）為對照值的 1.5 至 2.5 倍。

〔九十五年四月份通訊教育解答〕

- 1. (a)
- 2. (d)
- 3. (c)
- 4. (d)
- 5. (e)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (95.5)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____