

95 年度 6 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 95 年 7 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 一位 76 歲女性因性胸痛半小時，到急診求診，心電圖無 ST 段異常，心跳血壓及呼吸皆正常，病患在下列何種情形下須給予侵入性治療？
- (a) Troponin I < 0.01 。
 - (b) 密集抗缺血治療後，休息或低度活動時未復發心絞痛。
 - (c) LV 收縮功能下降。
 - (d) 非侵入壓力測試無高風險發現。
- () 2. UA/NSTEMI 患者進行血管重建，下列敘述何者為非？
- (a) UA/NSTEMI 患者接受 PCI 應使用靜脈注射血小板 GP IIb/IIIa 抑制劑。
 - (b) 有多條血管 CAD 的病患如果冠狀動脈解剖合適、LV 功能正常、且無糖尿病，則使用 PCI 。
 - (c) 對於糖尿病有接受治療的多條血管 CAD 患者，使用內乳動脈進行 CABG 療。
 - (d) 有明顯左主冠狀動脈疾病，施行 PCI 。
- () 3. 關於冠狀動脈血管重建術，下列敘述何者為非？
- (a) 執行冠狀動脈血管重建術 (PCI 或 CABG) 是為了改善預後、舒解症狀，預防缺血併發症。
 - (b) 對於計畫接受導管手術和 PCI 的病患，不應在 ASA 和肝素之外投與血小板 GP IIb/IIIa 拮抗劑。
 - (c) PCI 對 UA/NSTEMI 患者大多數能達到血管攝影層面的成功。
 - (d) 目前大部分的 PCI 都採用以氣球擴張後放置冠狀動脈血管支架。

- () 4. 56歲男性因 NSTEMI 接受心導管氣球擴張及血管支架植入，出院後下列處置何者為非？
- (a) 給予病患舌下或噴劑型 NTG
 - (b) LV 功能異常 (EF < 0.40) 或糖尿病的病患應使用 ACEI
 - (c) 使用 ASA 和 clopidogrel 最多 9 個月
 - (d) 低密度脂蛋白 (LDL) 膽固醇 < 200 mg/dL，只需飲食控制
- () 5. 下列有關 UA/NSTEMI 的敘述，何者為非？
- (a) 糖尿病患者的 CAD 較嚴重，病灶不穩定，合併症多，PTCA 的長期預後較差。
 - (b) 高齡患者 UA/NSTEMI 的症狀表現較不典型，心電圖壓力測試不易判讀，藥物反應和年輕患者不同。
 - (c) 糖尿病 multivessel disease 選擇接受 CABG (使用 SVGs) 比 PCI 好。
 - (d) post-CABG 患者 UA/NSTEMI 的藥物治療指引和未 CABG 患者相同。

〔九十五年五月份通訊教育解答〕

- 1. (c)
- 2. (a)
- 3. (b)
- 4. (b)
- 5. (d)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (95.6)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____