

96 年度 1 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 96 年 2 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 在 WPW 症候群的病人，當發生 AF 合併心室 preexcitation 時，並不建議使用以下藥物，何種除外？
- (a) amiodarone 。
 - (b) digoxin 。
 - (c) verapamil 。
 - (d) diltiazem 。
- () 2. 急性心肌梗塞合併 AF 病人，以下何者為非？
- (a) 若有嚴重血行動力失衡，或難以控制的心肌缺氧，使用電流去顫。
 - (b) 可使用靜脈注射 amiodarone 來減慢因 AF 導致的心博過速。
 - (c) 靜脈注射毛地黃對於減緩心博過速及改善左心室功能無任何幫忙。
 - (d) 使用持續性靜脈注射或間隔性皮下注射 heparin，使 aPTT 延長至對照值 1.5-2 倍。
- () 3. 關於懷孕時 Atrial Fibrillation 的治療，以下何者為非？
- (a) 可使用毛地黃控制心率。
 - (b) AF 引起血行動力不穩定時，不宜使用電流去顫。
 - (c) 依照懷孕的階段，選擇抗凝血劑或阿斯匹林來預防血栓或栓塞。
 - (d) 可使用乙型阻斷劑或 nondihydropyridine 之鈣離子拮抗劑控制心率。

- () 4. 對於 AF 病人竇性節律或比率的維持，以下何者為非？
- (a) 宜先治療誘發 AF 或造成 AF 的可逆因子。
 - (b) 有竇房結或房室結病變的病人，不可使用鈣離子拮抗劑來維持心律。
 - (c) 已知某種抗心律不整藥物會引發 proarrhythmia，而病人具有該藥物引發 proarrhythmia 的危險因子，則不宜使用該藥物。
 - (d) 若病人懷孕了，則原因使用的乙型阻斷劑和毛地黃需要停止使用。
- () 5. AF 病人合併肺疾的治療，以下何者為非？
- (a) 急性肺病或慢性肺病惡化病人發生 AF，應先矯正缺氧和血液酸化。
 - (b) 慢性阻塞性肺病病人，用 nondihydropyridine 之鈣離子拮抗劑（diltiazem 或 verapamil）控制心率。
 - (c) 慢性阻塞性肺病病人發生 AF，可使用乙型阻斷劑，sotalol，或 propafenone。
 - (d) 發生 AF 因而使血行動力不穩定，可用電流去顫。

〔九十五年十二月份通訊教育解答〕

- 1. (c)
- 2. (a)
- 3. (b)
- 4. (d)
- 5. (a)

TO: 中華民國心臟學會
Fax: 02-25976180
Re: 通訊教育回覆單 (96.1)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____