

97 年度 5 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 97 年 6 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 心臟心房顫動環狀肺靜脈燒灼術後造成之心房頻脈其機轉大部份為？
- (a) Re-entry 。
 - (b) Triggered activity 。
 - (c) Automaticity 。
 - (d) 以上皆非 。
- () 2. 下列心肌梗塞病人狀況，可顯示其為日後心因性猝死的高危險群：
- (a) 心肌梗塞 4 週後有較高的心率擾動 。
 - (b) 心肌梗塞 4 週後運動後 T 波變異異常 。
 - (c) 心肌梗塞 14 週後及左心室射出分率大於 50% 。
 - (d) 心肌梗塞 14 週後有較高的心率擾動 。
 - (e) 心肌梗塞 14 週後運動後 T 波變異異常 。
- () 3. 關於使用鎂離子靜脈注射來治療急性產生之心房顫動之敘述，何者有誤？
- (a) 相較於安慰劑或其他抗心律不整藥物，並無法更有效地使心房顫動轉變為竇性心律 。
 - (b) 合併毛地黃注射使用能夠使較多比例的病人心室速率小於每分鐘 100 下 。
 - (c) 鎂離子靜脈注射在減少心室速率方面優於鈣離子拮抗劑 。
 - (d) 鎂離子靜脈注射在減少心室速率方面不如 amiodarone 。
 - (e) 鎂離子靜脈注射有 17% 病人會造成暫時性臉潮紅、麻刺感或是頭暈 。

- () 4. 根據 Mant J 等人於 Lancet 期刊 2007 年發表的文章，針對有心房顫動的老年人，預防中風，何者是首選用藥？
- (a) aspirin 。
 - (b) coumadin 。
 - (c) clopidogrel 。
 - (d) cilostazol 。
 - (e) ximelagatran 。
- () 5. 下列敘述何者正確？
- (a) 為心電圖為 Narrow QRS complex 的心臟衰竭病人施行心臟再同步化治療將對病人有極大幫助。
 - (b) 若能成功為 Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/ cardiomyopathy 病人使用經導管電燒手術治療心室頻脈，就不需要置放體內去顫器。
 - (c) 為心肌梗塞病人施行預防性地電燒手術能有效的減少體內去顫器治療的次數。
 - (d) 在有左心室前壁心肌梗塞病史，但不符合需裝體內去顫器適應症的病人家中備有自動體外去顫器，將大幅改善病人 3 年存活率。
 - (e) 心電圖有明顯再極化異常的年輕運動員，將來不可能發生心肌病變。

〔九十七年四月份通訊教育解答〕

- 1. (d)
- 2. (d)
- 3. (c)
- 4. (b)
- 5. (a)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (97.5)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____