

97 年度 10 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 97 年 11 月 30 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 川崎病的盛行率以那一個地區相對較高？
- (a) 美洲。
 - (b) 歐洲。
 - (c) 東亞。
 - (d) 非洲。
- () 2. 冠狀動脈病變是川崎病童重要的後遺症，下列那一個選項是得到川崎病之後好發此種後遺症的次群 (subgroup) ？
- (a) 小於 6 個月的嬰兒。
 - (b) 對首輪 IVIG (免疫球蛋白) 治療沒有反應者。
 - (c) 具有某些特定的基因多型性 (single nucleotide polymorphism) 者。
 - (d) 以上皆是。
- () 3. 針對首輪使用 IVIG 無效的川崎病病人 (refractory KD) 下列何措施可以被考慮？
- (a) 再次投予 IVIG。
 - (b) 嘗試 TNF- α antagonism。
 - (c) 以上皆是。
 - (d) 以上皆非。
4. 針對川崎病所導致的冠狀動脈瘤 (coronary aneurysm) 下列何者為對？
- (a) 若為 giant aneurysm 目前建議合併使用 Aspirin 和 Warfarin。
 - (b) 冠狀動脈瘤隨著時間過去，有些會復原，但有些會合併鈣化或狹窄，甚至完全阻塞。

- (c) CT 或 MRI 是很好的追蹤工具。
 - (d) 以上皆對。
- () 5. 目前對過去曾有川崎病病史而無冠狀動脈瘤者的青少年或成人的建議，何者為誤？
- (a) 仍須定期追蹤（至少 3-5 年 1 次）。
 - (b) 追蹤到 10 歲即可。
 - (c) 須保持良好的生活型態。
 - (d) 部分病患血管硬度（arterial stiffness）會有增加的情形。

〔九十七年九月份通訊教育解答〕

- 1. (e)
- 2. (d)
- 3. (e)
- 4. (e)
- 5. (e)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (97.10)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____