

## 98 年度 4 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 98 年 5 月 20 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 法洛氏四合症接受完全矯正手術的年齡，目前一般建議是在：
- (a) 三個月以下。
  - (b) 三個月到兩歲之間。
  - (c) 兩歲到六歲之間。
  - (d) 六歲以上。
- ( ) 2. 下列何種對於 Congenitally corrected transposition of the great arteries (cc-TGA) 的外科手術治療，目前術後短中期的追蹤認為最好？
- (a) Anatomical biventricular repair (double switch)。
  - (b) Physiological biventricular repair。
  - (c) Univentricular repair。
  - (d) Heart transplantation。
- ( ) 3. 單一心室的手術治療，術前的危險因子不包括？
- (a) 肺動脈平均壓  $> 15$  mmHg。
  - (b) 肺動脈阻力  $> 4$  units/m<sup>2</sup>。
  - (c) 病人接受手術的年齡。
  - (d) 嚴重的房室瓣閉鎖不全。
- ( ) 4. 目前鑲嵌治療 (Hybrid procedure) 主要可以用在？
- (a) 周邊肺動脈狹窄。
  - (b) 肌肉型心室中膈缺損。

- (c) 左心室發育不全症。
  - (d) 以上皆是。
- ( ) 5. 下列對於未治療過的主動脈窄縮 (native coarctation of aorta) 在不同年齡治療的建議，何者正確？
- (a) 小於一歲的嬰兒建議外科手術治療。
  - (b) 兒童時期建議內科氣球導管或外科手術治療。
  - (c) 青少年時期以後或成人建議內科氣球導管合併支架置入。
  - (d) 以上皆是。

〔九十八年三月份通訊教育解答〕

- 1. ( a )
- 2. ( b )
- 3. ( c )
- 4. ( c )
- 5. ( b )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (98.04)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_