

98 年度 11 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 98 年 12 月 20 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 在駕駛中發生暈厥，最常見的原因為：
- (a) 神經原因的暈厥。
 - (b) 心律不整。
 - (c) 喝酒。
 - (d) 低血糖。
- () 2. 在駕駛中發生復發性暈厥最常見的係在第一次發作的？
- (a) 3 個月內。
 - (b) 6 個月內。
 - (c) 12 個月內。
 - (d) 12 個月以上。
- () 3. 整體長軸張力 (strain)，在僧帽瓣逆流的病患較正常人為：
- (a) 低。
 - (b) 高。
 - (c) 一樣。
 - (d) 隨個人差異而不同。
- () 4. 在下列何者型態的僧帽瓣逆流病人身上，利用束縮 (vena contracta) 面積來判斷僧帽瓣逆流的程度較為不準？
- (a) 中心性。
 - (b) 離心性。
 - (c) 兩者皆不準。

- () 5. 下列那些不是判斷僧帽瓣逆流程度的指標？
- (a) 束縮 (vena contracta) 面積。
 - (b) 有效逆流口徑面積 (EROA)。
 - (c) 彩色血流圖譜僧帽瓣逆流的面積。
 - (d) 左心室射出功率。

〔九十八年十月份通訊教育解答〕

- 1. (d)
- 2. (c)
- 3. (c)
- 4. (b)
- 5. (b)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (98.11)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____