

101 年度 8 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 101 年 9 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 心臟衰竭合併保留射出分率的病人，以下何者是可以使用的藥物？
- (A) NSAID
 - (B) Pioglitazone
 - (C) Diltiazem
 - (D) ACEI combine ARB and MRA
- () 2. 在心臟衰竭 NYHA Fc III-IV 的病患，合併 LVEF < 35%，若需要裝置心律調節器時建議改裝 CRT (cardiac resynchronization therapy) 是屬於那一種適應症？
- (A) Class I, level of evidence B
 - (B) Class IIa, level of evidence A
 - (C) Class IIb, level of evidence B
 - (D) Class IIa, level of evidence C
- () 3. 心臟衰竭的高血壓藥物治療，何者不被建議？
- (A) ACEI
 - (B) Beta blocker
 - (C) Thiazide diuretic
 - (D) Alpha blocker
- () 4. 急性心臟衰竭，除非有禁忌症，否則使用抗凝血劑用來預防血管栓塞是那一種的適應症？
- (A) Class I indication

- (B) Class IIa indication
 - (C) Class IIb indication
 - (D) Class III indication
- () 5. 在心臟衰竭 (NYHA Fc II-IV) 合併左心室射出分率減少的病人，若要用藥物控制心房顫動的心室速率，下列何者不被建議？
- (A) Amiodarone
 - (B) Dronedarone
 - (C) Beta blocker
 - (D) Digoxin

〔101 年 7 月份通訊教育解答〕

- 1. (C)
- 2. (C)
- 3. (A)
- 4. (D)
- 5. (D)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (101.8)</p>	
會員編號	
姓名	
答 案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

