

101 年度 10 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 101 年 11 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 根據 JUPITER 研究，下列何者並非屬於發生糖尿病的危險因子？
- (A) 代謝症候群
 - (B) 空腹血糖異常
 - (C) BMI 超過 30 Kg/m²
 - (D) hsCRP > 2 mg/L
 - (E) 糖化血色素超過 6%
- () 2. 根據 JUPITER 研究，初級預防時，statin 的使用在大約兩年後，何者敘述不正確？
- (A) 減少心血管事件的發生
 - (B) 增加平均糖化血色素
 - (C) 增加平均空腹血糖
 - (D) 減少冠心病死亡率
 - (E) 減少靜脈血栓發生率
- () 3. 根據 JUPITER 研究，statin 的使用與糖尿病的關係，何者敘述不正確？
- (A) 新發生糖尿病的風險來自於基礎的高風險因素。
 - (B) 新發生糖尿病的風險來自於基礎肥胖狀態。
 - (C) 新發生糖尿病的風險與基礎空腹血糖並無相關。
 - (D) 新發生糖尿病與否，Statin 都可以減少總體心血管事件。
 - (E) 新發生糖尿病與否，Statin 的副作用並無統計上的差異。

- () 4. 根據江晨恩教授的本土研究報告，何者敘述不正確？
- (A) 使用 Statin 每年大約增加（絕對值）0.3% 發生糖尿病的風險
 - (B) 在台灣使用 statin 的平均劑量要比西方的研究來的高
 - (C) 使用 statin 大約會增加（相對值）15% 發生糖尿病的風險
 - (D) 針對低心血管風險族群，開立 Statin 之前，應仔細衡量利弊得失
 - (E) NHIRD 資料庫分析的結果，較容易應用於 general population
- () 5. 根據江晨恩教授的本土研究報告，何者敘述不正確？
- (A) 新發生糖尿病與否，與病患的預後無關
 - (B) 即使新發生糖尿病，使用 statin 治療組，依然可以改善預後
 - (C) 使用 statin 作次級預防，效益遠大於發生糖尿病的風險
 - (D) 高危險族群使用 statin，效益遠大於發生糖尿病的風險
 - (E) 整體而言，statin 治療可以減少 18%MI，39% 住院中死亡

〔101 年 9 月份通訊教育解答〕

1. (C)
2. (E)
3. (C)
4. (D)
5. (D)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (101.10)</p>	
會員編號	
姓名	
答 案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

