

102 年度 12 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 103 年 1 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 根據 2013 ACC/AHA 新血脂治療指引準則，那些族群需要積極使用 statin 來降低心血管風險？
- (a) 臨床上已經有心血管疾病的患者
 - (b) LDL-C \geq 190mg/dL 的患者
 - (c) 無心血管疾病，40 到 75 歲而 LDL-C 介於 70 到 189mg/dL 的糖尿病患者
 - (d) 無心血管疾病或糖尿病，40 到 75 歲而 LDL-C 介於 70 到 189mg/dL，且 10 年心血管風險 \geq 7.5% 的患者
 - (e) 以上皆是
- () 2. 2013 ACC/AHA 新血脂治療指引準則並沒有提供治療建議於那些族群？
- (a) 糖尿病患者
 - (b) LDL-C \geq 190mg/dL 的患者
 - (c) 維持腎臟透析的患者
 - (d) 已經有心血管疾病的患者
 - (e) 以上皆非
- () 3. 根據 2013 ACC/AHA 新血脂治療指引準則，高強度的 statin 治療指的是 LDL 下降率與治療前相比可達多少？
- (a) \geq 80%
 - (b) \geq 50%
 - (c) 30- $<$ 50%
 - (d) $<$ 30%
 - (e) 以上皆非

- () 4. 根據 2013 ACC/AHA 新血脂治療指引準則，不符合 4 大重點治療族群的患者，臨床醫師可以參考其他因子，何者除外？
- (a) 一等親有早發心臟病家族史
 - (b) 高敏感度 C 反應蛋白
 - (c) 冠狀動脈攝影鈣化分數
 - (d) 腳踝 - 手臂指數 (ankle brachial index)
 - (e) 頸動脈內膜中層厚度
- () 5. 根據 2013 ACC/AHA 新血脂治療指引準則，若您有位 60 歲患者過去曾有心肌梗塞，治療前 LDL 抽血報告是 65 mg/dL，患者沒有使用 statin 的禁忌症，應當如何治療？
- (a) 給予高強度 statin 治療
 - (b) LDL <70mg/dL，因此不用 statin 治療
 - (c) 計算患者的 10 年心血管風險來決定是否給予 statin 治療
 - (d) 給予低強度 statin 治療
 - (e) 以上皆非

〔102 年 11 月份通訊教育解答〕

1. (d)
2. (c)
3. (b)
4. (a)
5. (e)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (102.12)</p>	
會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

